

RICOPERTURE RADICOLARI MULTIPLE

La presenza di recessioni gengivali nei settori anteriori e posteriori delle arcate dentarie può rappresentare un problema estetico per il paziente che, il più delle volte, lamenta l'eccessiva lunghezza dei suoi denti, che si rende evidente durante il sorriso. Inoltre a causa dell'esposizione radicolare la sensibilità al caldo e al freddo aumenta notevolmente.

Questo giovane paziente di 30 anni con biotipo tissutale sottile, lamentava un aumento della sensibilità dei denti anteriori posteriori dell'arcata inferiore, dovute ad un errato spazzolamento. Si notano le diverse recessioni gengivali e la scarsa quantità di gengiva cheratinizzata (rosa)



Per risolvere i problemi mucogengivali, si esegue un lembo a busta, senza incisioni verticali di rilasciamento, per evitare fastidiose e inestetiche cicatrici e per avere vantaggi in termini di predicibilità di ricopertura radicolare. Al di sotto del lembo si inserisce un innesto molto sottile di tessuto connettivale prelevato da una piccola finestrella palatina e in un unico intervento chirurgico vengono trattate tutte e 5 le recessioni. Il paziente con questa tecnica avrà il fastidio di un unico intervento chirurgico, riducendo inoltre i tempi del piano di trattamento.



L'aspetto dei tessuti dopo due settimane dall'intervento.

A sei mesi dalla chirurgia plastica parodontale si nota la perfetta guarigione dei tessuti molli e la ricopertura delle recessioni, senza aver modificato le caratteristiche cromatiche e di spessore dei margini gengivali che diventano indistinguibili dal tessuto marginale dei denti contigui.



Prima e dopo 6 mesi dall'intervento, il paziente non lamenta più la sensibilità radicolare ed è contento dell'aspetto estetico.

